



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**Prevalencia del trastorno por déficit de atención e  
hiperactividad en pacientes dependientes a sustancias  
hospitalizados en el Servicio de Adicciones del Hospital  
Hermilio Valdizán durante el año 2011 y 2012**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Para optar el Título de Especialista en Psiquiatría

**AUTOR**

Elmer Gonzalo VELÁSQUEZ MOLINA

**ASESOR**

Dr. Carlos ORDOÑEZ HUAMÁN

Lima, Perú

2013

## **RESUMEN**

Los Trastornos por Uso de Sustancias (SUD) son un grave problema de salud pública. El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD) es una comorbilidad asociada tanto al inicio y pronóstico del SUD.

El objetivo del presente estudio busca determinar la prevalencia de ADHD en pacientes con SUD hospitalizados en un servicio de salud mental altamente especializado

Se evaluó el diagnóstico de ADHD en 412 historias clínicas de pacientes dependientes a sustancias psicoactivas hospitalizados en el Servicio de Adicciones del Hospital Hermilio Valdizán, durante el año 2011 y 2012. Se utilizó el CIE-10 para la clasificación diagnóstica. Se encontró que el 72.57% (n=412) presentaban algún tipo de comorbilidad psiquiátrica. Su edad promedio fue de 30.38 años; el 67.23% eran solteros; el 43.93% tenía un grado de instrucción secundaria completa y el 43.2% estaba desempleado

El 29.37% de la población total (n=412) cumplían criterios para ADHD comórbido. La edad promedio de éstos fue 23.28 años, el 82.64% eran solteros, el 42.98% tenían secundaria completa y el 27.27% eran estudiantes. Del 81.82% representó ser ésta su primera hospitalización. El 69.42% inició su consumo entre los 14 y 16 años, la mayoría de ellos, 57.02%, con alcohol. Al momento de la hospitalización, el 44.63% utilizaba 3 sustancias, siendo la principal sustancia de abuso la pasta básica de cocaína (42.98%), seguido de la marihuana (26.45%).

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad está presente en tres de cada diez pacientes con dependencia a sustancias. El análisis primario del presente estudio parece encontrar una posible relación entre SUD y el ADHD.

## **PALABRAS CLAVES**

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Dependencia, Comorbilidad

## **SUMMARY**

Substance use disorders (SUD) is a severe public health problem. Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a comorbidity associated to the onset and prognosis of SUD.

The objective of the study was to determinate the prevalence of ADHD in SUD patients hospitalized in a highly specialized mental health institution.

ADHD diagnose was evaluated in 412 clinical histories of patients with dependence to psychoactive substances that were hospitalized on Hermilio Valdizan Hospital's Addiction Service, in 2011 and 2012. The ICD-X diagnostic criteria was used. The 72.57% of the patients (n=412) presented psychiatric comorbidity. Their average age was 30.38 years, the 67.23% were single, 43.93% had completed secondary education and 43.2% were unemployed.

Overall, 29.37% (n=412) of all SUD patients have ICD-X criteria for comorbid ADHD. Their average age was 23.28 years, 82.64% were single, 42.98% had completed secondary education and 27.27% were students. It was the first hospitalization for the 81.82% of them. The 69.42% started their consumption between 14 and 16 years, most of them, 57.02%, with alcohol. At the time of hospitalization, 44.63% used three substances, the main substance of abuse was the cocaine base (42.98%), followed by cannabis (26.45%).

ADHD is present in three out of ten patients with SUD. The primary analysis of this study suggests a relation between the dependency to psychoactive substances and comorbid ADHD.

## **KEYWORDS**

Attention-deficit hyperactivity disorder, Dependency, Comorbidity